



Instrucciones de Preparación para la Colonoscopia: CLENPIQ

Gastro Center of Maryland

Teléfono: 410-290-6677 Fax: 410-290-6676 | www.gastromaryland.com



SIGA ESTAS INSTRUCCIONES EXACTAMENTE. Si tiene preguntas, llame a la línea de enfermería de su ubicación.

¿QUÉ ES UNA COLONOSCOPIA?

Una colonoscopia es un examen del colon (intestino grueso) usando un tubo flexible del tamaño aproximado de un dedo meñique, que transmite imágenes en vivo a una pantalla. El colon debe estar completamente limpio para que el procedimiento sea exitoso.

- ☐ Proporcione una lista actualizada de sus medicamentos al menos **14 días antes** de su procedimiento.
- ☐ Recoja su receta de **CLENPIQ** en la farmacia con anticipación. No espere hasta el día anterior.

1 SEMANA ANTES

- ☐ Obtenga cualquier autorización médica necesaria antes de programar el procedimiento, si corresponde.
- ☐ **Suspenda los AINEs (antiinflamatorios no esteroideos) y el hierro 5 días antes del procedimiento. Esto incluye: ibuprofeno (Advil, Motrin), naproxeno (Aleve, Naprosyn), aspirina (Bayer, Ecotrin, Miniprin), diclofenaco (Voltaren, Cambia), celecoxib (Celebrex), meloxicam (Mobic), indometacina (Indocin), ketorolaco (Toradol) y otros. Puede tomar acetaminofén (Tylenol).**
- ☐ Revise sus medicamentos. Si toma **anticoagulantes** (Coumadin/warfarin, Eliquis, Brilinta, clopidogrel, etc.) o **medicamentos GLP-1 o para pérdida de peso** (Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Zepbound, Saxenda, Victoza, Trulicity, Byetta/Bydureon, Adlyxin, phentermine), debe suspenderlos **7 días antes** del procedimiento.

3 DÍAS ANTES

- ☐ **Suspenda todas las vitaminas y suplementos. Reduzca al mínimo la fibra en su dieta. Evite alimentos como frijoles, guisantes, maíz, palomitas de maíz, nueces, tomates, pepinos, pepinillos, semillas de sésamo, fresas, sandía, avena, kiwi, uvas y otros alimentos con semillas o cáscaras.**
- ☐ **Suspenda los inhibidores SGLT2, incluyendo: canagliflozina (Invokana), dapagliflozina (Farxiga), empagliflozina (Jardiance), ertugliflozina (Steglatro) y sotagliflozina (Inpefa).**

1 DÍA ANTES

Por la mañana (al despertar)

- ☐ **No coma alimentos sólidos. Tome solo líquidos claros durante todo el día (consulte la lista de líquidos claros).**
- ☐ **Suspenda hoy los medicamentos GLP-1 orales (como Rybelsus), metformina y gliburida.**

5:00 PM — Dosis 1 (CLENPIQ):

- ☐ Beba 1 frasco de CLENPIQ directamente del envase. Luego, beba 5 vasos de 8 onz. Cada uno (960 ml) de agua en 1 hora.
- ☐ Continúe con líquidos claros según lo tolere. No coma ni beba nada después de la medianoche, excepto la segunda dosis de la preparación.

DÍA DE SU PROCEDIMIENTO

5 horas antes de su hora de llegada — Dosis 2 (CLENPIQ)

☐ Beba el segundo frasco de CLENPIQ directamente del envase. Luego, beba 3 vasos de agua de 8 onz. Cada uno (720 ml) de agua en 1 hora.

4 horas antes de su hora de llegada — Nada por vía oral

☐ **No coma ni beba nada durante las 4 horas previas a su llegada. No chicle, mentas ni caramelos duros. Puede cepillarse los dientes, pero no trague agua.**

☐ Tome sus medicamentos de la mañana con un pequeño sorbo de agua, a menos que su médico indique lo contrario.

☐ **Si sus evacuaciones no son claras (transparentes, tipo agua amarilla), llame de inmediato a la línea de enfermería.**

REFERENCIA DE LÍQUIDOS CLAROS

Líquidos claros — PERMITIDOS PARA BEBER

Café o té negro	Agua
Jugo claro (manzana, uva blanca, arándano blanco)	Bebidas deportivas: Gatorade, Powerade, Propel
Refresco claro (Sprite, ginger ale, agua con gas)	Gelatina (Jell-O), paletas de hielo, hielo italiano
Caldo claro (pollo, res, vegetales)	Kool-Aid, Boost Breeze, té helado, limonada
EVITE COMPLETAMENTE: COLORANTES ROJO O MORADO, LÁCTEOS, JUGO DE NARANJA, TOMATE O TORONJA (POMELO), ALCOHOL Y CUALQUIER ALIMENTO O BEBIDA A BASE DE CREMA.	

POLÍTICA DE TRANSPORTE Y CANCELACIÓN

Transporte: No puede conducir ni operar maquinaria después de su procedimiento. Debe contar con un amigo, familiar o transporte médico organizado. El tiempo total en el consultorio es de aproximadamente 2 a 2½ horas. La persona que lo transporte no necesita quedarse esperando; nos comunicaremos con ella entre 20 y 30 minutos antes del alta. **No se permite el uso de Uber, Lyft ni taxis a menos que te acompañe un amigo o familiar adulto.** Comuníquese con nuestra oficina si necesita un servicio de transporte médico.

Cancelaciones: Entendemos que, de vez en cuando, puede necesitar cancelar una cita por diversas razones. Tenga en cuenta las siguientes reglas sobre cancelaciones.

- ☐ Cualquier modificación de horario requiere un aviso de al menos **5 días hábiles** para las citas de procedimientos.
- ☐ Las cancelaciones de procedimientos realizadas sin aviso adecuado están sujetas a un cargo al paciente de **\$200**.
- ☐ Si no asiste a su cita programada, se aplicarán los cargos mencionados anteriormente.

LÍNEA DE ENFERMERÍA — COMUNÍQUESE CON SU UBICACIÓN SI TIENE PREGUNTAS

Columbia/Cascades	(410) 913-1666	Olney	(301) 347-8780
Annapolis	(410) 913-1164	Riverdale	(410) 913-0061
Timonium	(443) 367-1144	Rockville	(227) 241-6377

Una enfermera lo llamará dentro de la semana previa a su procedimiento para revisar las instrucciones de preparación y responder sus preguntas.

